


Caudata

Ocasatí – Salamanders



- (01) rýhy v oblasti nozder
- (02) viditelné žebrování
- (03) hřbetní hřeben
- (04) ocasní hřeben
- (05) plovací blány za zadních nohou
- (06) vnější keříčkovité žábry

Ambystoma maculatum

Axolotl skvrnitý – Spotted Salamander




Foto: Todd Pierson



Genbank: MN135584

Má

- (01) na bocích viditelné žebrovaní
- (02) čtyři prsty na předních končetinách
- pět prstů na zadních končetinách
- (03) kruhové skvrny pouze na hřbetě ve dvou řadách

Nemá

- ocasní ani hřbetní hřebeny
- rýhy v oblasti nozder
- příušní žlázy (parotidy)
- plovací blány na předních ani zadních končetinách
- v dospělosti vnější keříčkovité žábry

Ambystoma maculatum

Axolotl skvrnitý – Spotted Salamander



Velikost

112 – 248 mm



Prostředí

preferuje nížinný tvrdý luh, případně smíšené lesy



Možné záměny s původními živočichy ČR

mlok skvrnitý *Salamandra salamandra*

Triturus marmoratus

Čolek mramorovaný – Marbled Newt



Foto: Joachim Nerz

Genbank: JN379828



Má

- (01) ocasní i hřbetní hřebeny
- (02) čtyři prsty na předních končetinách
- (03) pět prstů na zadních končetinách

Nemá

- na bocích viditelné žebrování
- rýhy v oblasti nozder
- příušní žlázy (parotidy)
- plovací blány
- v dospělosti vnější keříčkovité žábry

Triturus marmoratus

Čolek mramorovaný – Marbled Newt



Velikost

108 - 160 mm



Prostředí

rozmnožují se ve stojatých a pomalu tekoucích vodách, permanentních i dočasných
nenáročný na stanoviště




Možné záměny s původními živočichy ČR

čolek horský *Ichthyosaura alpestris* - samice

Salientia

Bezocasí – Frogs



- (01) příušní žlázy (parotidy)
- (02) bradavičnatá kůže
- (03) viditelný ušní bubínek
- (04) kulovité přísavky
- (05) hřbetní lišta
- (06) plovací blány za zadních nohou

Ceratophrys ornata



Rohatka ozdobná – Ornate Horned Frog



Foto: John White



Genbank: KP295693

Má

- (01) bradavičnatou kůži

Nemá

- viditelný ušní bubínek
- příušní žlázy (parotidy)
- plovací blány
- hřbetní lišty
- kruhové přísavky na koncích prstů

Ceratophrys ornata



Rohatka ozdobná – Ornate Horned Frog



Velikost

99 – 126 mm



Prostředí

otevřené biotopy typu
pampa do nadmořské výš-
ky 500 m n. m.
na souši, poblíž vody



Možné záměny s původními živočichy ČR

žádné

Lithobates catesbeianus

Skokan volský – American bullfrog




Foto: Jim Harding



Genbank: KY587197

Má

- (01) viditelný ušní bubínek
- (02) plovací blány na zadních nohou
- (03) zornice horizontální

Nemá

- bradavičnatou kůži
- příušní žlázy (parotidy)
- plovací blány na předních nohou
- hřbetní lišty
- kruhové přísavky na koncích prstů

Lithobates catesbeianus

Skokan volský – American bullfrog



Velikost

111 až 183 mm



Prostředí

dospělci zůstávají ve
vodních nádržích nebo
v jejich těsné blízkosti



Možné záměny s původními živočichy ČR

komplex rodu *Pelophylax* tj. zelení skokani

Litoria caerulea

Rosnice siná – Australian Green Treefrog




Foto: Eric Vanderduys



Genbank: AY883980

Má

- (01) viditelný ušní bubínek
- plovací blány na zadních nohou
- (02) kruhové přísavky na koncích prstů
- zornice horizontální

Nemá

- bradavičnatou kůži
- příušní žlázy (parotidy)
- plovací blány na předních nohou
- hřbetní lišty

Litoria caerulea

Rosnice siná – Australian Green Treefrog



Velikost

70 až 143 mm



Prostředí

suché lesy a křovinaté
planiny
poblíž vody, jak tekoucí
tak stojaté



Možné záměny s původními živočichy ČR

rosnička zelená *Hyla arborea*

Pyxicephalus adspersus

Hrabatka drsná – African Bullfrog



Foto: Peter Janzen



Genbank: KY177123

Má

- (01) bradavičnatou kůží
- (02) viditelný ušní bubínek
- (03) souběžné přerušované hřbetní lišty
- zornice horizontální

Nemá

- příušní žlázy (parotidy)
- plovací blány
- kruhové přísavky na koncích prstů

Pyxicephalus adspersus

Hrabatka drsná – African Bullfrog



Velikost

až 245 mm



Prostředí

otevřené savany a polo-
pouště, dočasné nádrže
toleruje pokles teploty
pod bod mrazu



Možné záměny s původními živočichy ČR

ropuchy rodu *Bufo* sp. a *Epidalea* sp.

Rhinella marina

Ropucha velká – Cane Toad



Foto: Peter Janzen

Genbank: KP149217



Má

- (01) bradavičnatou kůží
- (02) viditelný ušní bubínek
- (03) velké příušní žlázy (parotidy)
- (04) plovací blány na zadních nohou
- zornice horizontální

Nemá

- plovací blány na předních nohou
- kruhové přísavky na koncích prstů

Rhinella marina

Ropucha velká – Cane Toad



Velikost

85 – 238 mm



Prostředí

terestrická žába s noční
aktivitou
velmi adaptabilní



Možné záměny s původními živočichy ČR

ropuchy rodu *Bufo* sp.

Xenopus laevis

Drápatka vodní – African Clawed Frog




Foto: Frederik Nasserhoven

Genbank: GQ862287



Má

- (01) plovací blány na zadních nohou
- sploštělý tvar těla
- přerušovaná postranní čára
- (02) zornice kruhové

Nemá

- bradavičnatou kůži
- viditelný ušní bubínek
- velké příušní žlázy (parotidy)
- plovací blány na předních nohou
- kruhové přísavky na koncích prstů

Xenopus laevis

Drápatka vodní – African Clawed Frog



Velikost

46 – 147 mm



Prostředí

široká škála vodních habitatů, s výjimkou tekoucích vod a zarybněných nádrží



Možné záměny s původními živočichy ČR

skokani rodu *Rana* sp.
kuňky rodu *Bombina* sp.